INFORMED CONSENT

Skizofrenia merupakan gangguan mental kronis yang memerlukan terapi antipsikotik dalam jangka panjang. Meskipun efektif dalam mengendalikan gejala, penggunaan antipsikotik diduga dapat memengaruhi fungsi ginjal. Namun, hasil penelitian mengenai hubungan penggunaan antipsikotik dengan fungsi ginjal pada pasien skizofrenia masih menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan penggunaan antipsikotik dengan fungsi ginjal pada pasien skizofrenia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari rekam medis pasien skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan. Data yang diambil meliputi identitas pasien yang telah dikodekan, usia, jenis, durasi, dan bentuk sediaan antipsikotik yang digunakan, serta hasil pemeriksaan kreatinin serum yang digunakan untuk menghitung nilai estimated glomerular filtration rate (eGFR) sebagai penilaian fungsi ginjal.

Jakarta, 26 Juli 2026

FORMULIR PERSETUJUAN

Semua penjelasan di atas telah disampaikan kepada saya dan telah saya pahami. Dengan menandatangani formulir ini saya SETUJU SECARA SUKARELA untuk ikut dalam penelitian ini.

Nama peserta penelitian : Putu Adinda Pradnya Masayu

Tanda tangan : 

Tanggal : Minggu, 26 Juli 2026